

CIPERWALL T 2

INSETTICIDA ACARICIDA CONCENTRATO IN MICROEMULSIONE ACQUOSA,
AD AZIONE ABBATTENTE E RESIDUALE A BASE DI CIPERMETRINA E TETRAMETRINA
SINERGIZZATE CON PBO

PER USO PROFESSIONALE IN CAMPO CIVILE E DOMESTICO

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:	
Cipermetrina 92% min. (Cis/trans = 40/60)	4,35 g
Tetrametrina 95% min.	0,8 g
Piperonilbutossido 94% min.	2,4 g
Coformulanti e acqua q.b. a	100 g

ATTENZIONE



INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 - Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P270** - Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. **P273** - Non disperdere nell'ambiente. **P280** - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso. **P391** - Raccogliere il materiale fuoriuscito. **P501** Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le norme locali.

Titolare AIC: REA S.r.l. S.S. 87 km 20,700 - 81025 Marcianise (CE)
Numero di telefono: 0823.821210/821331

Officina di produzione: REA S.r.l. - Marcianise (CE)

Presidio Medico Chirurgico N. 19768 del Ministero della Salute

Contenuto netto: mL 10-20-30-40-50-100-200-250-500-750- L 1

Lotto n° : del

Per uso professionale: L 5-10-20-50-100-200

Validità: 2 anni (a temperatura ambiente)

CARATTERISTICHE

Il **CIPERWALL T 2** è un insetticida concentrato in microemulsione acquosa a base di Cipermetrina, Tetrametrina e di Piperonil Butossido con una triplice azione: abbattente, snidante e residuale.

Il **CIPERWALL T 2** è indicato per la disinfestazione di comunità, alberghi, ospedali, magazzini, mezzi di trasporto, attrezzature per l'igiene pubblica (cassonetti, trasporto rifiuti, ecc.), industrie alimentari, industrie o di altro genere e in prossimità di aree specifiche quali stalle e allevamenti.

Il **CIPERWALL T 2** è indicato sia per gli esterni che per gli interni di ambienti domestici: pareti, fessure, pavimenti, lungo gli stipiti delle porte e finestre, sui battiscopa dei pavimenti, cantine, depositi, nei pressi di cucce, ricoveri di cani e gatti. Negli ambienti l'azione insetticida persiste per alcune settimane (4 - 6). Il trattamento disinfestante può essere esteso su tappeti erbosi, siepi, cespugli, viali alberati solo per la lotta contro le zanzare.

CIPERWALL T 2 può essere utilizzato nei trattamenti di aree sensibili con nebulizzatori a caldo e a freddo: ULV, pompe a bassa pressione, pompe spalleggiate, atomizzatori e termonebbiogeni

CIPERWALL T 2 è attivo su insetti volanti tra cui tafani e mosche (*Musca domestica*), zanzare (*Aedes albopictus*), flebotomi, chironomidi e striscianti tra cui blatte e scarafaggi (*Blattella germanica*, *Blattella orientalis*), zecche (*Ixodidae*), pulci, cimici dei letti, acari come le zecche (*Ixodidae*).

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO

La soluzione insetticida mediamente va irrorata sulle superfici frequentate dagli insetti in ragione di 1 L per ogni 10 - 20 mq.

- Contro insetti volanti per trattamenti in interni: mosche: diluire 120-160 mL in 10 L di acqua (1.2-1.6 %)
- Contro insetti striscianti per trattamenti in interni: zecche, blatte e scarafaggi: diluire 200-300 mL in 10 L di acqua (2-3 %)
- pulci: diluire 100-200 mL in 10 L di acqua (1-2 %)

Allontanare gli animali durante il trattamento

- Contro insetti striscianti per trattamenti esterni: zecche, blatte e scarafaggi: diluire 200-300 mL in 10 L di acqua (2-3 %)
- pulci: diluire 100-200 mL in 10 L di acqua (1-2 %)
- Trattamenti all'esterno con atomizzatori: zanzare, chironomidi, flebotomi: diluire 20 - 80 mL in 10 L di acqua (0.2-0.8 %)
- Trattamenti con apparecchi termonebbiogeni: utilizzare 40-120 mL di prodotto in idoneo solvente per 10.000 mq (un ettaro)

AVVERTENZE: areare i locali sufficientemente prima del rientro. Non utilizzare il prodotto concentrato: attenersi alle indicazioni riportate nella modalità d'uso. Il contenitore non può essere riutilizzato. - Per un corretto uso del prodotto attenersi scrupolosamente a quanto riportato in etichetta e sulla scheda tecnica. - Evitare un uso eccessivo ed improprio del prodotto.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Blocco della trasmissione nervosa.

CONSULTARE UN CENTRO ANTIVELENI



NON DISPERDERE IL CONTENITORE NELL'AMBIENTE DOPO L'USO
NON RIUTILIZZARE IL CONTENITORE
DA NON VENDERSI SFUSO